

même à M. le Dr Möller pour son travail. La loi de priorité a obligé M. Dalla Torre de changer quelques noms dans son nouveau catalogue des formicides, et il faut se soumettre.

Le sous-genre *Acromyrmex* offre des difficultés énormes, et l'examen comparatif du type de l'*Atta coronata* Fab. que M. Meinert a bien voulu faire pour moi au Musée de Copenhague a eu pour résultat de me montrer que l'espèce que j'avais prise pour l'*A. coronata* n'était pas cela.

Genre ATTA FABR.

= *Cephalotes* Latr.

= *Ecudoma* Latr.

1. Subgen. *Atta* sens. strict Fab.

Les espèces *sexdens* L., *cephalotes* L., *fervens* Say et *insularis* Guérin sont maintenant bien connues et fixées. Il en est de même de l'*A. levigata* Smith, restaurée comme espèce dans le catalogue de Dalla Torre, mais que je considère encore, de même que Mayr, comme race de l'*A. sexdens*. L'*A. columbica* Guérin (= *Lebasi* Guérin) est moins bien déterminée, mais paraît devoir se maintenir. Les *Atta coptophylla* Guérin, *abdominalis* Smith et *sexdentata* Klug sont synonymes de l'*A. sexdens* L. Les *A. texana* Buckley et *mexicana* Smith sont synonymes de *fervens* Say.

A. *lutea* n. sp.

♀, L. 3 à 10 mill. Entièrement d'un jaune testacé et mat, pâle chez la ♀ *minima*, légèrement roussâtre sur la tête de la ♀ *major*. Très semblable à l'*A. sexdens*, mais plus grêle, plus petite et avec la tête relativement moins grosse (comme chez l'*A. columbica*). La tête est encore plus déprimée que chez l'*A. sexdens*.

♀ *major*. Tête comme chez l'*A. sexdens*, encore plus déprimée, sans tubercules distincts devant l'épine occipitale. Epine des arêtes frontales plus courte et plus lamelliforme. Les épines du pronotum sont très longues et très étroites dès leur base, lisses, luisantes et distinctement courbées en avant, aussi longues ou presque aussi longues que la distance de leur base au cou articulaire du pronotum. Epines mésonotaux pointues, plus longues que chez l'*A. sexdens*. Epines métanotaux fort longues aussi, étroites, luisantes, distinctement un peu courbées en avant. La partie postérieure du mésonotum est plus rétrécie que chez l'*A. sexdens*. Abdomen un peu plus étroit que chez l'*A. sexdens*. Le devant de son 1^{er} segment est subtuberculé.

Extrêmement finement et densément réticulée ponctuée et en