

- cæspitum, 10. F. petiolo nodis duobus alternis: posteriore majore.
Habitat in Europæ tuberibus.
- omnivo- 11. F. thorace bidentato, petiolo bimodolo, corpore te-
ra. ftaceo, abdomine fusco.
Brown. jam. 440. Formica domestica omnivora.
*Habitat in America meridionali, consumens & dilace-
rans omnia cibaria.*
Thorax lævis, adpersus punctis vix conspicuis eleva-
tis. Abdomen fuscum, pilis albis vix manifestis.
Petiolum nodis duobus teretiusculis. Corpus testaceum,
minutissimum.
- bidens. 12. F. thoracis gibbere bidentato, capite ovato, antennis
ferrugineis: articulo infimo nigro.
Habitat in America meridionali. Rolander.
Caput ovatum. Antennæ articulo primo longo nigro,
reliquis brevissimis ferrugineis. Thorax in medio spi-
nis 2 obtusiusculis, brevissimis, approximatis, s. gibbere
bidentato notatus.
- sexdens. 13. F. thorace sexspinoso, capite didymo, utrinque postice
mucronato.
Habitat in America meridionali. Rolander.
Caput pone bilobum s. didyimum, utrinque postice ter-
minatam spina solitaria. Thorax a tergo spinarum
tribus paribus armatum: quarum 2 priores antrorsum
prominentes; media 2 minima sunt; posteriores 2 ere-
ctæ. Petiolum Abdominis articulis duobus nodosus.
- cephalo- 14. F. thorace quadrispinoso, capite didymo magno utrin-
tes. que postice mucronato.
Merian. surin t. 18. f. majores.
Marcgr. bras. 252. Formica magna.
Habitat in America meridionali.
Corpus totum ferrugineo-pubescent. Caput crassissimum,
rotundatum, postice didyimum cum spina utrinque bre-
vi. Thorax antice spinis 2 erectis, distantibus; postice
spinis 2 erectis, approximatis. Petiolum abdominis
tuberculis duobus, uno post alterum, notatus.
- atrata. 15. F. thorace quadrispinoso, capite depresso marginato
utrinque bispinoso.
Marcgr. bras. 252. Tapiiai.